

## 勃起不全（ED）の方の同意事項について

### 【予想される効果】

シルденаフィル（バイアグラ）とタダラフィル（シアリス）とバルденаフィル（レビトラ）は、性行為が行う1時間ぐらい前（タダラフィルは3時間前）に空腹状態で1錠を服用（頓服）することで、十分な性行為を行うのに十分な勃起とその維持を期待することができるお薬です。

### 【可能性のある副作用や注意事項等】

頭痛、紅潮、ほてり、背部痛、消化不良等の症状があらわれることがあり、一部死に至るような健康被害もあります。心臓に障害のある方はこれらの薬を処方される前に必ず担当医師にご相談ください。

医師が必要と判断した時点で検査を行うことがあります。その結果服用するのに支障があると考えられた場合には、ED治療薬の服用を中止しさらに医療機関の受診が必要になることがあります。

副作用など何か気になる症状や気がかりなことがありましたらすぐに担当医師にお申し出ください。

### 【その他の患者さんにお守りいただきたい事項】

狭心症の方では、硝酸剤又は一酸化窒素(NO)供与剤(ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド等)との併用により降圧作用が増強し、過度に血圧が下降することがあります。併用薬については担当医師に相談し十分に確認してください。

医師により勃起不全に関する診療について説明を受け、併せてバイアグラやシアリスやレビトラを使用することの意義および効果、副作用等についての説明を受けました。また、医師が判断した事項に際して、同意が得られない場合や併用薬あるいはお身体の状態によっては、安全性が担保出来ない可能性があるため、お薬を出すことが出来ないことがあります。

上記説明内容をよく理解し、EDの治療を受けることに同意いたします。

令和 年 月 日

署名： \_\_\_\_\_